



# Temzo 40

Esomeprazole 40 mg

enterik örtülü tabletler №30

Farmakoterapeutik qrupu *Proton pompasının inhibitoru*

## Farmakoloji xüsusiyyətləri

Ezomeprazol zəif qəlevi maddədir; mədənin yüksək turş mühitində parietal hüceyrələrin sekretor kanalcıqlarında toplanır və aktiv formaya keçərək proton nasosunu ( $H^+K^+ATF$ -aza fermentini) inhibib edir. Ezomeprazol xlorid turşusunun həm bazal, həm də stimullaşdırılmış sekresiyasını zəiflədir.

1 Temzo **gündə**

## Istifadəsinə göstərişlər

- Mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi**
- H.pylori-nin eradikasiyon müalicə kompleksinin tərkibində**
- Qastro-ezofageal reflüks xəstəliyinin (GERD) simptomatik müalicəsi**
- Eroziv reflüks ezofagitin müalicəsi**
- QSİP qəbul edən pasiyentlərdə qastropatiyanın profilaktikası**
- Funksional dispepsiya**
- Zollinger-Ellison sindromu**
- Mədə və ya 12-barmaq bağırsaq xoraları olan böyük xəstələrdə infuziya məhlulu ilə müalicədən sonra təkrar qanaxmanın qarşısının alınması məqsədilə**

## Istifadə qaydası və dozasi

- Qastro-ezofageal reflüks xəstəliyi:** 1 tablet gündə 1 dəfə. Müalicə müddəti 4-8 həftədir.
- Mədə və ya 12-b.b. xorası:** 1 tablet gündə 1 dəfə. Müalicə müddəti 4 həftədir.
- QSİP - qastropatiya:** QSİP qəbulu ilə yanaşı 1 tablet gündə 1 dəfə.
- Mədə və ya 12-b.b. xorası zamanı təkrar qanaxmanın profilaktikası:** PPI-nun infuzion məhlulu ilə aparılan müalicədən sonra 4 həftə ərzində gündə 1 dəfə 1 tablet
- Mədədə turşu ifrazının artmasına səbəb olan hormon hasil edən şışlar daxil olmaqla, mədə turşuluğunun artmasına səbəb olan hallarda (Zollinger-Ellison sindromu):** 1 tablet gündə 2 dəfə (max. sutkalıq doza 160 mg) Temzo örtülü tabletleri qida qəbulu ilə və ya acqarına qəbul edilir.

## Əks göstərişlər

Təsireddi və ya köməkçi maddələrdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslığı olan; digər proton pompasının inhibitorlarına (pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol) qarşı allergiyası olan; atazanavir və ya nelfinavir (İİV (QLCS) müalicəsi üçün istifadə olunan dərman) alan şəxslərdə istifadə olunmamalıdır.

**Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri; Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri:** Bax "Istifadəsinə dair təlimat".

**Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadə:** Hamiləlik zamanı hər hansı dərmanı qəbul etməyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə məsləhətlenin. Laktasiya dövründə istifadə olunmamalıdır.

**Buraxılış forması:** Temzo 40 mg enterik örtülü tabletler №30.

**İstehsalçı:** Opes Healthcare Pvt. Ltd., Hindistan

## Ədəbiyyat:

- Katz PO, et al. Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. PRACTICE GUIDELINES. Am J Gastroenterol 2013; 108:308-328
- Scott LJ, et al. Esomeprazole: a review of its use in the management of acid-related disorders. Drugs. 2002;62(10):1503-38.
- Hunt R, et al. Глобальные перспективы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Практические рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической Организации. Октябрь 2015

# Temzo 40

Esomeprazole 40 mg

enterik örtülü tabletler №30



**Turşuluq probleminin  
tez və uzunmüddətli həlli**

Qərb ölkələrində əhalinin 10-20%-də  
QERX (Qastroezofageal Reflüks xəstəliyi)  
əlamətləri müşahidə olunur<sup>1</sup>




GERX olan pasiyentlərdə fiziki funksiyalar  
zəifləmiş, əmək faydalılığı azalmış, yuxu və həyat  
keyfiyyəti pozulmuşdur<sup>1</sup>

GERX-nin empirik müalicəsi məqsədilə  
PPI-ları tövsiyə olunur<sup>1</sup>

Müxtəlif medikamentoz müalicə növlərində  
Eroziv Ezofagitin bütün mərhələlərində  
sağalma tezliyi<sup>1</sup>

PPI



PPI EZOMEPRAZOL (**Temzo**) QERX-nin müalicəsi, 12 b.b. xorası  
xəstəliyində H.pylori infeksiyasının eradikasiyası məqsədilə  
təyin olunan yüksək effektiv və təhlükəsiz preparatdır<sup>2</sup>

# Temzo 40

Esomeprazole 40 mg

enterik örtülü tabletler №30

8 həftə müddətində PPI-ları ilə müalicə alan Eroziv Ezofagitli  
pasiyentlərdə (n>5000) endoskopik təsdiqlənmiş sağalma tezliyi<sup>2</sup>

Ezomeprazol  
40 mq/sutkada

92,6%



Lansoprazol  
30 mq/sutkada

88,8%



Ezomeprazol (**Temzo**) təyin olunmuş Eroziv Ezofagitli  
pasiyentlərdə sağalma tezliyi əhəmiyyətli  
dərəcədə daha yüksək olmuşdur<sup>2</sup>

Simptomatik GERX (ezofagit əlamətləri olmayan) pasiyentlərdə  
4 həftə müddətində təyin olunmuş 40 mq/sutkada ezomeprazol  
(**Temzo**) simptomları effektiv şəkildə aradan qaldırılmışdır<sup>2</sup>

Müləyim simptomlu və ya qeyri - eroziv GERX zamanı  
“tələbata görə müalicə” (preparatin periodik qəbulu) faydalı olur<sup>3</sup>:

- Qəbul edilən preparatin miqdarı } azalır
- Müalicənin dəyəri
- Pasient öz simptomlarını nəzarət altında saxlaya bilir

